



邹 鹏 / 图

冬季养鸡 做好几种疫病防治

冬季鸡群易发弱毒性禽流感、禽霍乱、传染性鼻炎、传染性支气管炎、传染性喉气管炎、痘病等疫病。预防的主要原则是做好环境消毒、及早进行免疫接种，要对照免疫接种计划表、免疫接种记录表和秋冬季鸡常发病免疫程序，进行认真检查和分析，对超过免疫保护期的鸡群、没有接种的鸡群、免疫效果不好的鸡群，都应及时补种疫苗，保证鸡群安全度过冬季。

1. 预防弱毒性禽流感。可用禽流感灭活疫苗，2~5周龄鸡颈部皮下或胸部肌肉注射0.3毫升，5周龄以上鸡注射0.5毫升，接种后14日产生免疫力，免疫保护期为4个月。

2. 预防禽霍乱。可注射禽霍乱弱毒菌苗或禽霍乱灭活菌苗，弱毒菌苗的免疫保护期为3~5个月，一般在6~8周龄进行首次免疫，10~12周龄进行二次免疫；灭活菌苗的免疫保护期为3~6个月，一般在10~12周龄进行首次免疫，

16~18周龄进行二次免疫。

3. 预防传染性鼻炎。可肌肉注射A型油乳剂灭活苗和A至C型二价油乳剂灭活苗，免疫保护期为整个产蛋期，一般在25~40日龄时进行首次免疫，110~120日龄时进行二次免疫。

4. 预防传染性支气管炎。可选用H120弱毒疫苗、H52弱毒疫苗、新城疫传染性支气管炎二联弱毒疫苗、鸡肾型传支活疫苗、新城疫传染性支气管炎二联多价油乳剂灭活苗、鸡肾型传支多价油乳剂灭活苗等疫苗。一般于1~5日龄、3~4周龄用H120弱毒疫苗进行滴眼滴鼻，35~50日龄、16~18周龄用H52弱毒疫苗饮水用。

5. 预防传染性喉气管炎。可使用传染性喉气管炎弱毒冻干疫苗点眼、滴鼻，免疫保护期为6个月，一般4~6周龄进行首次免疫，16~20周龄进行二次免疫。

6. 预防痘病。可皮肤刺种鸡痘鹤鹑化弱毒疫苗，一般在10~20日龄进行首次免疫，开产前进行二次免疫。

另外，有些地方26~32周龄的鸡，易发生鸡产蛋下降综合征，导致产蛋率突然下降20%~50%。针对这一情况，可注射鸡减蛋综合征油佐剂灭活苗进行预防，免疫保护期为10~12个月，一般在110~130日龄时进行接种。

摘编自《河北农民报》