

春季茶园生产管理技术指导意见

一、施好催芽肥

1. 根施催芽肥。春季催芽肥宜在倒春寒后或春茶开采前施用，保证茶树养分供应充足。以速效氮肥为主，每亩施用高氮复合肥 20～30 千克，采用开沟施肥的方法进行，沟深约 10 厘米，施后立即覆土。

2. 施用叶面肥。春季可喷施 2 次叶面肥，一般在春茶新梢萌发前喷施 1 次，两周后再喷施 1 次。喷施宜在晴天上午 10 点前、下午 4 点以后或者阴天进行。常用叶面肥包括水溶型尿素、氨基酸水溶肥、腐殖酸叶面肥和沼液肥，其中，水溶型尿素类叶面肥可按尿素 5% 的浓度，氨基酸类叶面肥以每亩 50 毫克有效成分为宜，腐殖酸叶面肥以 2% 的浓度喷施，每亩用量 15 千克，沼液肥以有效氮浓度约 2% 为宜。

二、抓好采摘作业

1. 及时开采。茶园开采宜早不宜

迟，当茶树蓬面有 5%～10% 的春梢达到采摘标准时就要开采。要掌握好采摘周期，达到标准的及时采。尽量把采摘面上的嫩梢按标准采尽，否则会导致春梢老化，不仅影响当季茶叶品质，还会抑制下轮茶叶的萌发生长，进而影响茶叶产量。

2. 分批采摘。在采摘旺期，要组织足够的采摘工，每隔 3～4 天采摘一批次，前期通过人工手采名优茶，后期可采用机械采茶方式提高采摘效率。

3. 运输保鲜。鲜叶应在 4 小时内运到茶叶加工厂，经专人验收后尽快摊放在清洁阴凉的屋内。运送鲜叶的容器采用透气性好、清洁的竹编筐，容量以 10～20 千克为宜，运送途中避免挤压，减少损伤。如鲜叶不能及时送到加工厂，一定要在干净通风处摊放保鲜，避免日晒雨淋，然后尽快送往加工厂。

来源：农业农村部网站



郝亚鑫 / 图