

野鸡又叫雉鸡，性情活泼，喜欢游走觅食，食量小，食性杂。野鸡具有较高的经济价值，其肉质蛋白质含量高、口感细嫩鲜美。野鸡养殖育肥要把握好以下5点：

1. 科学饲喂。采用原粮饲喂雉鸡，可适当增加玉米、高粱等能量饲料的饲喂比例（推荐配方：小麦15%、玉米40%、菜子饼15%、麦麸5%、米糠4%、炒熟豌豆20%、骨粉1%，另每吨料加入食盐2.5公斤及适量微量元素）；购买家鸡饲料的，可购买肉鸡生长料进行饲喂，还可添加10%~20%的青饲料，并保证充足的饮水。此外，每周至少沙浴一次，要在河沙中喷入2%的敌百虫溶液，以杀灭体外寄生虫。

2. 控制密度。5~11周龄雉鸡，每平方米饲养10~12只，以后可按强弱、公母、大小进行分群饲养，使其密度逐步降至每平方米6~8只。同时，

应设置足够的料槽以供平均采食，保证生长速度一致。

3. 设栖架防啄癖。饲养雉鸡的舍内外应放置栖架，供雉鸡栖停，这样能充分利用养殖空间，还有利于减少啄癖。在高密度饲养中，雉鸡易发生啄羽等现象。发现有啄伤的雉鸡，应在其伤口处涂紫药水或樟脑软膏，并进行隔离饲养。必要时，对野鸡群进行调控：（1）在舍内挂青草或青菜，引诱雉鸡啄菜，以减少啄羽现象。（2）9~11周龄时，可在饲料中加入1%的羽毛粉。（3）在饲料中添加的食盐占比为2.5%，也可在饮水中添加食盐，保证供水充足。另外，为避免啄伤，可在雉鸡雏期适时断喙。

4. 防惊飞。惊飞容易造成鸡群撞伤或撞死，因此可剪掉雉鸡一侧低级翅羽。尽可能保持养鸡场内安静，以减少外界的惊吓和影响。

5. 做好防疫工作。每天清扫鸡舍，每周用消毒剂对圈舍进行一次全面消毒。雉鸡8~9周龄时，进行新城疫Ⅱ系疫苗饮水接种（按打针用量的2倍）。育肥期间，应在饲料中添加0.04%的土霉素或其他抗生素，以防禽疫病发生，一般投药1周，停1周后再投药1周。

来源：农业之友

野鸡养殖育肥要点

