



扫码阅读

1. **合理选地。**滇重楼种植范围广，海拔 500 ~ 3000 米区域均可种植。滇重楼适宜在气候湿润、雨量适当的林下荫蔽处生长。因此，育苗地一般选在地势较高、排水良好的林下空地、坡地或旱地。土壤宜疏松多孔、土质富含腐殖质的腐殖土或酸性红壤土。

2. **整地遮阴。**土地深翻 25 厘米以上，翻耕时将土块打碎并捡去石块等杂物。结合翻耕，每亩施入腐熟有机肥 3 吨 ~ 3.5 吨。平整土地后，捞沟拢墒，墒宽 120 厘米、沟宽 35 厘米、沟深 25 厘米；用钢管、水泥桩等建棚，并覆盖防晒遮阴网。

3. **选种育苗。**育苗有种子繁殖和切块繁殖两种方式，通常用种子繁殖。

(1) 选种并预处理。选择籽粒饱满、成熟度高、无病虫害、无发霉变质、无损伤，千粒重为 40 ~ 70 克的滇重楼种子。人工去除外皮，在晴朗天气下暴晒 2 ~ 3

天，提高种子吸水能力。将种子和细沙按照 1 : 3 的比例混合后贮藏在 20℃ 的温度条件下预处理 4 个月，等种子露白后便可播种。其间要保持沙子湿润，间隔半个月翻动一次，避免烂种。播种前一周，用浓度为 0.5% 的多菌灵溶液对土壤消毒。

(2) 科学播种。处理过的种子可点播、条播或散播。一般情况下定植密度为 4 厘米 × 4 厘米，播种深度控制在 2 厘米。播种完毕后，在种子前方覆盖 1.5 ~ 2 厘米薄土层，再盖一层腐熟的细碎树叶，提高出苗率，利于小苗出土。

(3) 水肥管理。播种后要结合苗床干湿情况，一般间隔半个月浇水 1 次。当种子长出胚根，浇水后喷施 1 次浓度为 0.2% 的磷酸二氢钾溶液和浓度为 0.5% 的多菌灵溶液。出苗后，要做好遮阴处理，及时除去杂草。

4. **适时移栽。**一般幼苗生长至第 3 年便可移栽，移栽宜在冬季进行，也可在六七月份进行青苗分栽。按照行株距 20 厘米 × 25 厘米的规格栽植，移栽过程中注意保护顶芽和须根不受损伤，以提高成活率。移栽后及时在上方覆盖遮阴网，高度控制在 1.8 ~ 2 米。

5. **中耕除草。**重楼属于浅根类作物，且主要在秋冬季节萌发新根。立春前后逐渐长出新苗，发现有杂草应及时拔除，注意不能伤及幼苗和地下根茎。日常要加强中耕除草，在地下茎生长初期，用小锄头轻轻中耕，不能过深，以免伤及地下根茎。

滇重楼种植管理要点

