



肉羊催肥方法

1. 羊舍准备。羊舍的饲养密度以每只羊占地 0.5 ~ 0.6 平方米为宜。羊舍应建在通风、便于排水、采光、避风向阳、接近牧地及饲料仓库的地方。

2. 饲草饲料准备。在整个育肥期，每天需为每只羊准备干草 2 ~ 2.5 公斤、青贮饲料 3 ~ 5 公斤或氨化饲料 3 ~ 5 公斤；精饲料每天按每只羊体重的 2% 准备。

3. 育肥羊选择。用于育肥的羊，应选用当年的羔羊和青年羊，其次才是淘汰羊和老龄羊。选好育肥羊后，要做好驱虫、去势、去角修蹄，以及定时称重、记录等工作。

4. 饲养管理原则。(1) 掌握精、粗饲料比例。精饲料一般占日粮的 1/3 为宜，科学的精、粗饲料比，既能提供能量，又能满足肉羊对蛋白质的需要，还能维持瘤胃的正常活动。(2) 控制蛋白质水平。蛋白质在肉羊日粮中所占比例应在 8% 左右。

5. 使用预混料。羊的预混料种类很多，均是精选适合肉羊生理、消化的原料调配而

成，富含羊不同生长阶段所需的蛋白质、维生素、微量元素、矿物质，以及抗病促生长剂等，饲喂羊预混料，可使肉羊健康，皮毛光滑。可适当添加氨基酸调节剂，羊食用时适口性更好，可显著提高羊对精料及粗饲料的采食量，明显提高日增重。食用预混料的肉羊，日增重可比食用其他饲料平均提高 20%。

6. 饲喂量和饲喂方法。肉羊的饲料饲喂量要根据其采食量来定，吃多少喂多少。采食量与羊的品种、年龄、性别、体格和饲料适口性、水分有关。羊采食量越大，其日增重越高。羊日采食干草 2 ~ 2.5 公斤，新鲜青草 3 ~ 4 公斤，精饲料为体重的 2% 左右。饲喂方法是先喂干草或粗料，然后喂精料，自由饮水。

7. 日常管理措施。日常管理中要让肉羊适量运动，既要降低消耗，促使增重，也要避免因长期不运动导致的消化不良、脾胃虚弱，影响育肥。

李渊丽

摘编自《山西农民报》