

正常情况下，牛犊出生后1小时内便能自行站立，但有些牛犊很难站立或无法站立，原因主要有以下几个方面：

1. **缺钙**。一种为先天性缺钙，即出生时便缺钙。主要是母牛妊娠期钙摄入量不足，或钙磷比例失衡等引起。另一种为后天性缺钙，即出生时正常，但由于摄入食物（主要为母乳）中钙含量不足，牛犊缺钙会一天比一天严重。救治方法：可人工喂一些钙片。此外，要给哺乳期母牛多喂一些豆粕。

2. **缺硒**。缺硒可造成白肌症，一般30日龄后发病，牛犊看似正常，但是不能站立。救治方法：缺硒的牛犊，可注射亚硒酸钠维生素E注射液。

3. **体弱或早产**。母牛孕期饲养管理粗放、饲料质量差、运动量少、体质差等，均可造成牛犊体弱或早产，导致无法站立。救治方法：养殖户应细心照料牛犊，并定时进行人工辅助吃

奶；将其放置在温暖、干净、柔软的垫草上，每天饲喂10~20毫升鱼肝油，一般经过5~10天的细心照料便可自行站立。

4. **温度过低或未及时吃上初乳**。牛舍温度过低，会带走牛犊体内的热量，再加上未及时吃上初乳，营养供给不足，牛犊极可能会出现站立困难。救治方法：母牛产房温度应保持在15℃以上，在牛犊出生后，要及时擦干其身体上的黏液，并辅助其吃足初乳。

5. **先天性肢体残疾**。有些牛犊由于近亲繁殖或其他原因，导致先天性的肢体残疾。这类牛犊出生后肢体便带有残疾，并且难以恢复。救治方法：尽可能对牛犊肢体进行矫正，如捆绑木片等，同时加强钙的补充。

白静

摘编自《农业科技报》

新生牛犊无法站立 原因及救治方法

