

农户需经常用消毒药品对猪舍和食具进行消毒，特别是病猪的圈舍和用具。现将常用的几种消毒剂的配制和使用方法介绍如下：

1. **草木灰水**。草木灰与水按3 : 10的比例混合，煮沸后小火煮1小时，过滤后取滤液使用。可用在猪舍、地面、圈栏、工作服等的消毒。草木灰必须新鲜、干燥，草木灰水趁热使用，效果较好。

2. **石灰乳**。按生石灰与水1 : 1的比例混合，待石灰块化成浆糊状，再加水40 ~ 90份，即成浓度10% ~ 20%的石灰乳。常用在猪舍的墙壁、地面、圈栏等地方的消毒。石灰乳中加入浓度1% ~ 2%的烧碱，可增强消毒效果。不宜放置过久，要现用现配。

3. **生石灰粉**。按生石灰与水10 : 5的比例混合，使其分解成粉末即可使用。可撒在猪舍门口的消毒池（盆

内），也可用在猪舍（尤其是阴暗潮湿的地面）、粪池及污水等地方消毒。不宜放置过久，现用现配。

4. **烧碱**。按烧碱与水1 : 97的比例混合，充分溶解后即成浓度1% ~ 3%的烧碱水。可用在用具、猪舍、运输工具等的消毒。在烧碱液中加入浓度5%的石灰水，可增强消毒效果，此配制剂应趁热使用。此外，该剂有强腐蚀性，用时要注意人畜安全。

5. **漂白粉**。按漂白粉与水5 : 80的比例混合，搅拌后即成浓度为5% ~ 20%的混悬液。可用在猪舍、用具、地面、粪便、污水等的消毒。漂白粉应装在密封的容器内，不能用在金属及工作服的消毒。此配制剂有强腐蚀性，用时要注意人畜安全。

## 猪舍消毒剂配制与用法

摘编自《重庆科技报》

1. **精心育雏**。雏鸡刚孵出时，要保温育雏。1周龄最适宜温度35℃ ~ 36℃，2周龄

为32℃ ~ 34℃，以后每周降低2℃，5 ~ 7周龄就可脱温。脱温2天后，如发现1/3的雏鸡有用嘴啄地的现象时即可开食。开食前几天饲喂半熟的小米，并拌入熟蛋黄，蛋黄量按每18只雏鸡每天1个即可。7天后，改喂混合饲料，饲料以半熟的谷物为主，辅以青菜、鱼粉、维生素。育雏时，每平方米可饲养17只左右。饮用水要清洁、充足，初期喂温水，水中应加入浓度为万分之一的高锰酸钾消毒。

2. **成年鸡饲养**。雏鸡生长较快，30日龄即可生长丝毛，50日龄体重可达250克。平时要保持鸡舍卫生，湿度适宜，饮水充足。产蛋期

## 乌鸡饲养管理要点

