

1. **选用良种。**选用良种是马铃薯高产栽培的一个重要环节。

2. **切块催芽。**约在3月初开始催芽。切好后用灰干拌或多菌灵粉剂1:200倍兑水浸种进行杀菌消毒。待种块晾干后即开始苗床催芽，一是在室温15℃以上的屋角内用沙催芽，一层沙一层种块；二是在室外的通风朝阳处东西方向挖坑催芽，坑深25厘米左右，一层沙一层种块，3层为宜，然后加拱棚薄膜覆盖，夜间加盖草帘保温。当芽长至0.5~1厘米时，开始播种。

3. **选地整地。**下种前看土地墒情，墒情不好可考虑灌沟造墒。马铃薯种植一般为双沟定植，开沟时可采用大行50厘米，小行40厘米。

4. **播种盖膜。**播种时，种块置入沟内的方法有两种：一是种芽朝下，长出的马铃薯根长苗壮，马铃薯小但块大，苗晚两三天；二是种芽朝上，此法长出的马铃薯根相对较短，马铃薯个小但数量多，且苗早两三天。下种结束后，从大行内两边取土将马铃薯沟及小行的空间盖好耙平，加膜盖严实。



春季马铃薯种植技术

5. **出苗放风及苗期管理。**播种后20天左右，即有苗露土，此时可将露苗处的膜打破放风，以防蒸苗。待苗长到10厘米高时，将苗周围的膜用土压严。马铃薯生长的前期不宜浇水，待见花后再浇。天旱无雨可每隔10天浇水一次，收获前10天停止浇水。

6. **科学施肥。**当幼苗出土80%时，重施一次速效提苗肥，在马铃薯苗期开始喷施“地果壮蒂灵”，使地下果营养运输导管变粗，提高地果膨大活力，果面光滑，果型健壮，优质高产。马铃薯喜农家肥，每亩施2000~2500公斤为宜。

7. **病虫害防治。**晚疫病、霜霉病、青枯病等病害发病初期，用甲代森锰锌500倍液+新高脂膜于晴天露水干时喷雾防治，发现青枯病要整株拔除集中焚烧处理，还要在病穴及周围撒施石灰或用0.5%福尔马林溶液灌根消毒，再喷施农用链霉素2000倍液+新高脂膜进行防治。

杨丛林

摘编自《农业科技报》