

春季养蛋鸭“三注意”

1. **选好放牧场地。**在早春秧苗转青前，将母鸭赶到水塘、河沟里，让其觅食鱼虾、泥鳅及水生生物。到春耕时，可在耕翻后准备栽秧的绿肥田放牧，这种田有较多的草籽、草根、蚯蚓、昆虫等天然饲料可供母鸭采食。插秧的稻田因为撒有化肥或农药，不宜作为放牧场所。

2. **精心放牧。**早春气温偏低，宜晚放牧、早收牧，并逐渐延长放牧时间。放牧时要注意水温，下水、上坡要慢赶，以防伤及鸭掌。遇到刮风天气应逆风放牧并适当控制鸭群的行走速度，避免风掀鸭羽，使鸭受凉。产蛋鸭胆

小易惊，放牧路线变动不应过于频繁。要注意鸭群中的公母比例，以免鸭群骚乱，影响母鸭产蛋。

3. **适时补喂饲料。**产蛋旺季母鸭产蛋强度很大，每天放牧活动量也大，采食的活食和青饲料虽容积大，但营养低，一般难以满足产蛋的营养需要。因此，每天应根据母鸭产蛋的多少与鸭群采食状况适时补喂饲料。在气温较低时还适当补饲谷物等能量饲料，以增强母鸭免疫力。

郑卫军

来源：中国农科新闻网

1. **急性胀气病。**春天，羊在放牧时会过量啃食青草，或在舍饲时因长期喂干草，偶喂青草，导致贪食，吃后在胃中急性发酵，产生大量气体，使羊反刍发生阻碍，瘤胃迅速扩张，形成急性胀气病，如救治不及时或

方法不当会导致羊死亡。救治方法：找一截香椿或柳树根放入羊嘴内，两端用绳子绑在羊身上，让羊咀嚼，再用新鲜草木灰 10 ~ 20 克兑植物油 50 ~ 100 毫升灌服。如都不奏效，再请兽医穿刺放气。

2. **误食毒草毒物。**羊吃了被农药污染的青草、有毒野菜野草、腐烂物等，会发生中毒，其症状为口吐白沫、口鼻发紫、呼吸急促。此时应紧急援救，方法为：让羊口含木棍，通过唾液排毒，然后灌鸡蛋清 5 个，皮下注射阿托品 2 ~ 5 毫升。

3. **感冒。**早春乍暖还寒，忽热忽冷，羊易发生感冒。对病羊可肌肉注射氨基比林或安乃近 5 ~ 10 毫升、青霉素 160 万单位、链霉素

早春养羊需“六防”



邹鹏/图