

1. **干湿问题。**肉牛用料共有三种，即干粉料、湿拌料（水料1：1）和稀料，根据养殖户多年喂养经验，湿拌料喂法采食量最好，稀料最差。

2. **粉碎粒度。**玉米粒度要求在0.8～1.5毫米为佳，如果过粗，饲料的利用率下降，造成浪费；过细，有可能造成消化道溃疡，同时会导致适口性下降，从而影响采食量。

3. **盐分。**正常生长的育肥肉牛对盐的需求量在0.8%，如果盐分从0.8%下降到0.4%，肉牛的采食量可下降20%，增重也会减少。

4. **甜味剂。**肉牛的味觉非常发达，其舌部的味蕾数为人类的3倍，肉牛最喜食的是甜味，如饲料中含有甜味剂时，采食量就会上升。

5. **水分。**缺水初期，肉牛食欲明显减退，尤其不爱吃干粉料，随着失水增多，肉牛的食欲可能完全废绝。所以，一定要给牛饮足够的水。

6. **添加剂。**在饲喂肉牛时，可以添加益生菌等添加剂，调节瘤胃内的菌群平衡，能够明显改善胃肠道微生

## 春季如何提高肉牛采食量



态环境，促进吸收，显著提高肉的品质，还能够提高肉牛免疫力，有效防止消化系统疾病，对顽固性腹泻效果明显。

米沁媛

摘编自《农业科技报》

50万单位；也可用生姜100克、葱2根，切碎熬汤兑红糖50～100克灌服，一日2次，连服2天。

4. **腹泻。**羊在冬季大都单食干草，春季乍吃青草，肠胃无法立即适应，若吃多会造成腹泻或胀气。防治办法：青草、干草搭配饲喂，不能一下子都喂青草，羊肠胃有个逐渐适应过程，发生腹泻时可给羊口服庆大霉素。

5. **寄生虫病。**春季羊在低洼地放

牧或饮用塘水、吃脏草等，体内外易感染寄生虫，所以在三四月间应对羊进行体内外驱虫。

6. **过敏反应。**个别羊在放牧时采食青草、野菜或接触异味时会产生过敏反应，表现为打喷嚏、流眼泪、走步蹒跚，此时应立即将羊赶离过敏区，一般很快能恢复正常。

黄伟杰

摘编自《农业科技报》