



邹 鹏/图

## 云南农村肉羊养殖“八改”技术

生产实践中,以肉羊养殖“八改”技术为核心,提高了全省肉羊生产综合配套技术的应用辐射面,肉羊养殖效益和生产水平明显提高,形成了稳定高效的生产体系,对推动肉羊产业高质量发展具有重要意义。

### 1. 改“老式羊舍”为“高床补饲羊舍”。

(1) 选好场地。选择地势较高、干燥向阳、水电方便的地方建设羊舍。(2) 健全设施。舍内设施包括羊床、隔栏、饲草饲料投放通道、饲槽、饮水槽、颈枷、可移动羔羊保温箱和羔羊补饲槽等;舍外设施包括运动场、运动场隔栏、饮水装置等。

(3) 面积合适。高床羊舍的羊床面积以每只羊 1.5 平方米为宜,羊床宽度为 2.6 米~3 米。(4) 高度适中。粪坑底设计成距离羊床 1.8 米~2.5 米,方便人员从下侧进入收集羊粪;上层舍高 2.5 米~3 米,羊床低于过道 40 厘米~50 厘米。(5) 饲槽合格。饲槽上宽下窄,槽底呈圆形,槽底部高于

羊床平面 10 厘米~15 厘米,羊床至饲槽上缘高 40 厘米~50 厘米(育成羊 30 厘米~35 厘米),饲槽设在靠过道侧羊床外,饲槽靠羊床侧设置颈枷。(6) 运动场足够。面积应是羊床面积的二三倍,场内应设置栅栏,方便分群运动。

2. 改“大群饲养”为“小群精细化饲养”。结合羊舍条件,相同生长或生理阶段的羊只养于相应栅栏或羊舍内,实行小栅栏精细化饲养。每栏饲养能繁母羊 10~15 只,在隔栏上设置可滑动的门,便于羊只分群。

3. 改“乱交滥配”为“有计划地经济杂交”。(1) 引进优良种公羊杂交,改良本地羊,提高杂交羊产羔率、生长速度和产肉量。(2) 公、母羊分群饲养,母羊长至 10~12 月龄进行第一次配种,杜绝早配。(3) 空怀母羊、妊娠母羊、哺乳母羊、育成羊(断奶至初配)、育肥羊分隔饲养,以便补饲、观察发情情况、及时配种、接生羔羊等。(4) 不要急于配种,可在母羊发情后 12 小时进行第一次配种,每间隔 12 小时再配