

种一至二次。(5)利用云上黑山羊杂交本地黑山羊,或黄色波尔山羊杂交本地黄山羊,提高养殖效益。

(6)为提高后代质量,不用年幼公羊、年幼母羊以及年老公羊、年老母羊配种。

4.改“不种草”为“全株玉米青贮、种草养羊相配套”。(1)采用窖贮、包膜、袋贮或桶贮等方式,制作全株玉米、牧草等,进行青贮。

(2)充分利用冬闲田和果园种植高产刈割利用饲草,可采取光叶紫花苕+玉米(马铃薯)、一年生黑麦草+水稻、大麦+玉米(马铃薯)、荞麦+烤烟、蚕豆+水稻、萝卜+玉米(马铃薯)等模式。推行“果—草—羊”种养循环模式,提高种养效益。

(3)科学配比肉羊日粮,按干物质核算,青贮料占体重的2%~3%,块根及其他粗饲料占体重的1%,精饲料占体重的1%~1.5%。

5.改“靠天养羊”为“适时补草补料”。(1)母羊妊娠后期适当增加活动量,多晒太阳;降低青贮饲喂量,提高优质青干草喂量,每天补0.4~0.6千克精料;单张羊床面积达2.5平方米以上;分娩前10天饲喂母羊青绿多汁饲料,分娩后饲喂温盐水,促进泌乳。(2)哺乳前期(羔羊产后60天内),每天补饲精料0.6~0.8千克。(3)新生羔羊(出生1小时之内)及时吃到初乳,做好羔羊防寒保暖工作。(4)羔羊出生后5~7天,可到运动场

自由活动;出生后15~20天开始补饲羔羊专用颗粒饲料、优质鲜草或干草。(5)加强瘦、弱母羊营养供给,提高母羊的泌乳量;母羊奶水不够时,可饲喂专用羔羊代乳粉。(6)羔羊体重达12千克以上应及时断奶,不宜做种羊的小公羊,在二三月龄时及时去势,转入育肥羊饲养。

6.改“养大龄羯羊出栏”为“青年羊育肥适时出栏”。(1)开展青年羊育肥,或者出栏前强化育肥。根据育肥羊所处生理阶段、养殖场(户)饲草饲料来源、饲养管理水平综合确定育肥方式和育肥期长短。(2)及时出栏商品羊,本地羊育肥到30~35千克、杂交羊育肥到35~40千克,及时出栏。

7.改“有病靠治”为“预防为主”。(1)重点做好口蹄疫、小反刍兽疫、羊痘、传染性胸膜肺炎、三联四防、传染性脓疱疫苗的免疫注射,建立免疫档案,并接受监督检查。(2)注重环境卫生,树立“预防为主、防重于治、养防结合”的意识,积极开展预防性体内外寄生虫的驱除。

8.改“小群体粗放散养”为“半舍饲半放牧适度规模养殖”。(1)结合家庭劳动力数量、饲草饲料资源、可放牧草山、草坡、林地面积,构建种养结合的适度规模半舍半牧或全舍饲。(2)形成以家庭为单元,职业化、效益稳定、生态良好、可持续的家庭牧场养殖模式。