

犊牛提前2至3个月断乳，有助于缩短母牛产犊间隔、降低母牛饲养成本，同时可使犊牛的生长性能提高，缩短后备牛的饲养时间，节约饲养成本。

### 一、新生犊牛护理

**1. 清理黏液。**人工助产的新生犊牛，应在第一时间清理干净其口、鼻内的黏液，保证其呼吸正常后，让母牛舔干犊牛全身的黏液。正常分娩的犊牛，如果呼吸正常，无需人工护理。

**2. 让犊牛及时吃到初乳。**正常犊牛在出生后30分钟内能自行站立，并能自行觅吮母乳。对于少数不能吃到初乳的犊牛，应人工辅助其及时吃到初乳。对母乳供给不足的犊牛，在加强母牛营养的同时，可找其他泌乳性能好的母牛代哺。

**3. 保持牛舍卫生。**保证犊牛舍通风、清洁、舒适。每天要细心观察犊牛，有异常情况要及时诊断治疗。

### 二、哺乳期诱食

**1. 犊牛出生10天后的补饲。**每天在补饲槽内放置少量易消化的青草或优质青干草、精饲料，供犊牛自由采食，同时供给清洁饮水。

**2. 投放精料。**根据犊牛粪便情况逐渐增加精料投喂量，切忌一次投放一天的精料和贸然增加投喂量。否则，

容易引起犊牛消化不良和胃肠膨胀，导致犊牛腹泻，甚至死亡。

**3. 保证犊牛有充足的光照和活动空间。**需限制犊牛在牛舍或场内活动，避免犊牛在牛场内到处乱窜，防止犊牛在外误舔异物、污物、饮脏水。定时对犊牛活动场所进行清扫、消毒，防止犊牛因感染细菌而发病。

### 三、断乳期饲养管理

**1. 分群饲养。**按照体重大小分群饲养，并根据犊牛的生长和采食快慢情况，对牛群进行灵活调整分群。

**2. 投喂饲料。**刚断乳时粗饲料以易消化的优质牧草、青干草为主，可辅以少量优质青贮料，投料要少量多次添加。视犊牛生长情况，逐渐增加投喂量和减少投喂次数，一般每天投喂精料2次。同时，及时清理水盆或水槽内的异物，定期清洗和消毒。

**3. 做好定期消毒。**犊牛舍、生产用具要定期消毒，认真观察断乳犊牛粪尿、运动、精神状态等，做到及时发现病犊牛并及时治疗。驱虫时，要防止犊牛发生腹泻。

**4. 接种疫苗。**在断乳2个月后进行疫苗接种，以防止母源抗体的干扰。

来源：云南省农业农村厅网站

## 犊牛提前断乳技术要点



邹 鹂/图