

地段，以橡胶树单种为主，保护带适度保留林下原生植被或种植绿肥。

4. **适时定植。**定植季节以雨季初、中期为主。穴土湿透时，及时定植。定植后穴面应当覆盖2厘米厚的松土，并盖草，也可覆盖地膜。

5. **林下养殖。**适时在胶园种植牧草，养殖一定数量的家禽、蜜蜂，形成胶-禽、胶-蜂、胶-羊、胶-牛等种养一体化生态模式。

6. **除芽修枝与补换植。**未分枝的幼树在每年低温期后，及时除去低部位萌动芽，修剪寒害枯枝。已分枝的幼树，第一轮分枝应当保持在3米以上。珍费用材及乡土树种只保留主干。经济林树种应修除下垂枝，适当疏去过密枝、病枯枝等。补植，可用与原定植同品种、同苗龄苗木进行补换。对越冬后的缺株、弱株再进行一次补换，用同品种大一龄的苗木补植。

7. **科学施肥。**根据土壤和植物营养诊断结果进行科学施肥，以有机肥为主，化肥为辅。在每年雨季初期和后期施入有机肥10~20千克/株。橡胶树配方肥应在5~9月施用1至2次，第一年0.4千克、第二年0.5千克、第三年0.6千克、第四年起施0.8~1千克。幼树可沿橡胶树冠

滴水线（垂直投影处），吸收根最密集处开挖施肥沟。开割橡胶树，平缓地在两行橡胶树中间开挖施肥沟，坡地在种植带内侧开挖施肥坑，坑长1米、宽0.4米、深0.4米。仅施化肥时可开宽0.2米、深0.2米的沟。

8. **梯田除草盖草。**幼林梯田面可用降解膜或防草席覆盖抑草，保护带杂草生长旺盛，可多次人工或机械控草，保持原生植被或覆盖作物厚50厘米以下。定植的树种根圈应常年进行盖草，盖草距树干10厘米、半径60厘米以上、厚度15~20厘米。有寒害地区，入冬前应将盖草扒开，或结合维修梯田在草面盖土，也可用地膜覆盖。

9. **梯田维护。**梯田维护每隔1至2年进行1次，除了在扩挖肥穴时穿插进行外，也可在雨季结束后统一作业，做到梯田面平整、内倾，出现露根要及时培土，崩缺或下陷要及时填补。

10. **病虫害防控。**合理间作、套种，加强胶园和水肥管理，清洁胶园、挖隔离沟；人工捕捉害虫、悬挂黑光灯诱杀或释放天敌控制蚧虫等；喷施硫磺粉、低毒高效农药防治橡胶树常见病虫害。

来源：云南省农业农村厅网站