

一、栽种覆荫树

覆荫树少的茶园，选择根深、枝叶稀疏、透光性强、与茶树争水抢肥少、无共同病虫害的树种进行补植，每亩栽植覆荫树约12株。覆荫树覆荫度大、透光不足时需疏枝调控，禁止砍伐茶园内的覆荫树，将透光率控制在70%左右。

二、茶园管理

1. 割草。全年人工割草或机器割草1至2次，割完的杂草就地铺在茶树根茎部，禁止使用化学药剂除草。

2. 施肥。每年9月至11月，以树干为中心，在树冠覆盖边缘垂直的地面开挖深30厘米左右的环形施肥沟，施入经无害化处理的牲畜粪便、厩肥或堆肥，禁止施用化学肥料，每株古茶树施肥量约50千克，施后盖土。

3. 耕作。土壤肥沃松软、树冠覆盖率高、茶园，应免耕；肥力低下、土壤板结、茶树衰老的古茶园，可结合施肥在树冠覆盖范围内适当深耕，耕作深度30厘米左右，杂草作填埋处理。

三、树冠管理

1. 树枝修剪。在每年5月中下旬，修剪古茶树上的枯枝、弱枝、病虫枝和徒长枝。对于较细小的树枝，用小枝剪剪除；较粗大的树枝，用大枝剪剪除或手锯锯除，禁用砍刀等工具。

2. 病虫害防控。注意保护鸟类、蜘蛛、瓢虫、草蛉等茶树害虫的天敌，可有针对性地使用真菌、细菌、病毒类病原微生物制剂防控病虫害，禁止使用化学药剂。

3. 寄生物清除。用枝剪剪除茶树上的寄生物，苔藓、地衣等寄生物要用削好的竹片将其刮除干净，或在树干上喷洒石硫合剂、45%松碱合剂、苔藓净300倍液等。

4. 鲜叶采摘。采摘古树茶，应留1至2片真叶，杜绝采鱼叶（即茶树芽头露出，萌发出的第一片小叶子）和马蹄（即茶叶中的木质化老梗），确保叶面积指数大于4。采摘标准根据生产需求而定，一般以一芽二叶、一芽三叶为主。对于树势衰弱的古茶树，应以养为主，以采为辅，一般仅在春季采摘，夏季、秋季不建议采摘。

5. 补种。茶树稀少的古茶园，应就地采种直播或育苗补植茶树，株行距参照原来的古茶园栽植规格。

古茶园管护技术



郝亚鑫/图

来源：云南省农业农村厅网站