

1. **选种。**根据各地实际，选择优良的黑山羊品种。优良的基因能够壮大和优化黑山羊种群，在羊群繁殖时选用生产性能好、遗传稳定的种母羊和种公羊进行配种，但要避免近亲繁殖。

2. **饲料搭配。**首先要根据种类不同进行分群饲养，并饲喂不同的饲草，同时还要饲喂一些饲料作为营养补充。这样既可以满足羊群的不同营养需要，又能缓解饲草减少的情况，有助于草场恢复生产力。

3. **改善羊群生长环境。**黑山羊的圈舍应建在远离居民区、水源地，且无羊病传染史的地方，且地势要干燥、向阳、通风良好，坐北朝南修建，需有足够的空间供羊群活动，圈舍内各个功能舍配备齐全，具备防寒降温设施。

4. **保持卫生整洁和定期消毒。**养殖户应保持圈舍卫生，及时清理粪便等污物，将其运送到远离圈舍的地方进行无害化处理。同时，保持圈舍干燥通风，做好灭蚊虫、灭鼠等工作，切断传染病的传播媒介，以减少疾病传播。定期消毒，每次要



邹 鹏/图

黑山羊养殖管理技术

做到全面彻底、不留死角，常规消毒1周2次，消灭环境中的病原菌，减少疾病发生，消毒剂可选用10%~20%生石灰水、烧碱、百毒杀等，但应避免烧碱与羊体接触。

5. **开展驱虫和免疫接种工作。**羊群中一旦出现病羊，要及时隔离治疗。如果出现病死羊，需进行无害化处理，禁止随意丢弃。由于黑山羊大部分疾病都是由体内外寄生虫引起的，若黑山羊已确诊为患寄生虫病，还会引发其他疾病，轻则影响羊只的生长发育速度，重则会引发羊只死亡。因此，前期驱虫工作很重要，一般2至3个月要驱虫1次，每年都要打疫苗，尤其是传染性胸膜肺炎疫苗。

6. **季节性管理。**春季，羊群多处于膘情差、体质弱的状态，此时舍饲是主要的养殖方式，可利用上年贮备的青干草和氨化饲草进行舍饲喂养。夏、秋季节草场生长茂盛，正是抓膘催肥的有利阶段，要精心放牧，但要防止羊群中暑，同时需定期更换草场，使饲草得到充分利用。冬季要做好防寒保暖工作，尤其要加强对羔羊和老弱病残羊的护理。

来源：农业之友网