



## 秋季养鹅重防“八病”

秋分时节过后，气候逐渐转凉，昼夜温差较大，鹅易发生小鹅瘟、球虫病、鹅流感、鹅白痢等疾病。养鹅场和养鹅户应做好相应防治措施，以降低养殖损失。

1. **小鹅瘟**。该病是一种急性败血性传染病，主要表现为离群、嗜睡、抽搐、下痢等。应以预防为主，在种鹅产蛋前1个月左右，连用2次小鹅瘟疫苗，提前预防。小鹅一旦染病，可喂藿香正气水进行治疗，每次1毫升，每日2次。

2. **球虫病**。该病主要危害3周龄至3月龄的小鹅，预防应集中在20~90日龄期间。可在每千克饲料中加入氯苯胍50毫克（治疗量用100毫克），连用10天。

3. **鹅流感**。该病主要发生在雏鹅群，大多因气温突变而致。病鹅出现精神萎靡、食欲不振、群鹅挤成一堆、流鼻涕、摇头晃脑等症状，病程3~5天，治疗不力则死亡。治疗方法：给病鹅肌肉注射青霉素，也可口服磺胺嘧啶片，同时注意保暖。

4. **鹅白痢**。该病主要是由细菌感染所致。用辣椒粉、生姜适量，放入锅内炒几分钟，然后拌入米糠再炒，炒熟放凉后喂鹅，连喂2天可治愈。

5. **中毒症**。喂鹅的青饲料中常有残留农药，往往

引起鹅群中毒，若不立即抢救，易造成死亡。救治时，用手把鹅嘴掰开，及时灌进干尿素10~15粒，然后喂水，再到河里放牧，让其自由饮水。2小时后，中毒鹅便能逐渐恢复正常。

6. **软脚病**。该病主要是饲料中缺乏矿物质和维生素D所致。治疗方法：每只鹅每次喂服维生素D约10毫克，每天2次，连喂3~5天。

7. **风湿症**。该病又称“风脚病”。防治时将雏鹅的脚掌叉剪开，挤出污水，放入尿液中浸泡3~5分钟，即可痊愈。

8. **禽霍乱**。该病是由禽巴氏杆菌引起的一种急性败血性传染病。急性型病鹅体温高达41℃~43℃，表现出闭目呆立、精神萎靡、没有食欲等症状，发病2至3天会出现死亡。发病后应及时治疗，可用青霉素和链霉素合剂肌肉注射3至4天，每天2次，并在饲料中加入0.02%的复方新诺明，治疗效果会更好。

王笃兰

摘编自《农业科技报》