

一、栽培设施

大花蕙兰盆花采用温室栽培。钢架结构联栋温室，每栋跨度8米，棚高不低于5.3米（具体高度依据当地气候条件选择），长度不宜超过80米；薄膜覆盖，顶窗开度2米，侧窗开度2米，侧窗开窗距离地面0.3米。天窗采用电动开合，侧窗手动或电动开合皆可。采用水肥供给系统和微喷系统。采用钢架和铁丝构建的离地种植床，床高0.6米至0.7米，床宽2.4米，各种植床间留0.6米宽过道。

二、品种选择

优先选用松树皮作为栽培基质，苗期采用细树皮，中苗和大苗采用粗树皮。宜选适应性强、株型美观、花箭和花蕾



邹鹏/图

大花蕙兰盆花生产技术

数多、出箭齐整、抗逆性强、适合市场需求的新优品种。黄色花瓣的有“黄金岁月”“金光”，红色的有“红袍”“红霞”“肯尼”，粉色的有“福星”“福娘”“爱恋”，绿色的有“玉观音”“世界和平”等。

三、定植

每年3月至6月是瓶苗移栽定植时期。定

生率。与非十字花科作物合理轮作；施用盾壳霉或木霉菌等生物防治菌杀灭土壤中的菌核，降低田间菌核数量；选用“戊唑·咪鲜胺”、“异菌·氟啶胺”、菌核净等药剂进行防治。

3. 跳甲。主要是黄曲条跳甲。在油菜出苗期成虫为害幼苗，防治不及时会造成缺苗断垄。防治方法：播种前，采用噻虫嗪、呋虫胺拌种或包衣种子可预防出苗期跳甲；出苗时可采用氟啶虫胺胍、烯啶虫胺、吡啶啉、噻虫嗪、抗蚜威等药剂进行防治。

4. 蚜虫。主要是萝卜蚜、桃蚜和

甘蓝蚜。在油菜薹期、花薹期开始为害，防治不及时可造成油菜籽减产50%以上，并诱发病毒病等病害。防治方法：优先选用抗蚜虫、耐蚜虫品种；油菜生育期，在地边和田间设置黄色粘板，可大量诱杀有翅蚜虫；或在油菜地间隔铺设银灰色地膜、悬挂银灰色膜条，可抑制有翅蚜虫聚集；还可采取糖醋液、树干缠草绳和诱虫灯等诱杀蚜虫；利用蚜茧蜂、草青蛉、食蚜蝇、七星瓢虫、异色瓢虫等蚜虫天敌和蚜霉菌进行防治。

来源：云南省农业农村厅网站