

一、体外寄生虫

药浴或涂擦。可选用浓度 25% 二嗪农溶液、50% 辛硫磷乳油、5%S- 氰戊菊酯溶液、12.5% 双甲脒乳油等杀虫剂，按说明书经稀释后合理使用。当群体中有 5% 以上的羊只有体外寄生虫且有蔓延增多趋势时，应及时开展群体药浴，同时对羊床、饲喂通道、运动场和食槽消毒，以彻底杀灭虫体及虫卵。少量羊只出现体外寄生虫时，可用浓度 25% 二嗪农溶液、50% 辛硫磷乳油、5%S- 氰戊菊酯溶液、12.5% 双甲脒乳油等杀虫剂在患部涂擦，涂擦后第 3 天用伊维菌素按每千克体重 0.2 毫克皮下注射。分别在每年 3 至 4 月、9 至 10 月各进行 1 次预防性药浴。

二、体内寄生虫

遵循育肥前驱虫、配种前驱虫、雨季结束后驱虫、新引进羊只驱虫后再并群的原则；驱虫宜在傍晚进行，应收集驱虫后 5 天内排出的粪便集中堆沤发酵，也可在其中掺入消毒液，以杀灭病菌和虫卵。分别在每年 3 至 4 月、9 至 10 月各进行 1 次预防性驱虫。根据不同寄生虫病情况，选择适合的驱虫药



邹 鹏 / 图

肉羊体内外寄生虫防治方法

进行治疗或不定期预防性驱虫。

1. **片形吸虫**。按每千克体重用 10 毫克三氯苯唑（肝蛭净）口服；用硝氯酚针剂按每千克体重用 0.75 ~ 1.0 毫克进行肌肉注射，或按每千克体重用 4 ~ 7 毫克硝氯酚配成悬浊液一次口服。

2. **双腔吸虫**。按每千克体重用 50 ~ 70 毫克吡喹酮一次口服。

3. **血液原虫（焦虫）**。用三氮脒（贝尼尔、血虫净）治疗，按每千克体重 3 至 4 毫克配成浓度 5% ~ 7% 溶液进行肌肉注射，每天 1 次，连用 2 天。

4. **莫尼次绦虫**。按每千克体重用 80 毫克氯硝柳胺（灭绦灵）或硫双二氯酚（别丁）配成水溶液口服。

5. **消化道线虫**。按每千克体重用左旋咪唑 5 ~ 10 毫克配成水溶液口服。

6. **蛔虫**。按每千克体重用丙硫咪唑或阿苯达唑 10 ~ 20 毫克 1 次口服。

7. **球虫**。用地克珠利（杀球灵）预混剂按每千克饲料 1 毫克混饲或按每千克水兑药 0.5 ~ 1 毫克饮水，连用 4 至 5 天。

邵庆勇

（云南省畜牧兽医科学院草食家畜研究所）