



## 肉羊催肥要抓住重点

1. 羊舍准备。羊舍的饲养密度以每只羊占0.5至0.6平方米为宜。羊舍应建在便于通风、排水、采光、避风向阳和接近牧地及饲料仓库的地方。

2. 饲草料准备。整个育肥期，每天为每只羊准备干草2~2.5千克、青贮饲料3~5千克或3~5千克的氨化饲料等，每天按每只羊体重的2%准备精饲料。

3. 育肥羊选择。一般情况下，用于育肥的羊应选用当年的羔羊和青年羊，其次是淘汰羊和老龄羊。选好育肥羊后，接着要做好驱虫、去势、去角修蹄、定时称重、做好记录等工作。

4. 饲养管理原则。(1) 掌握精、粗饲料比例。适当的精、粗饲料比例，既能提供能量，又能满足肉羊对蛋白质的需求，还能维持瘤胃的正常活动，因此精饲料以占日粮的1/3为宜。

(2) 控制蛋白质水平。蛋白质在肉羊日粮中所

占比例应在8%左右。

5. 使用预混料。羊的预混料种类很多，都是精选适合肉羊生理、消化的原料调配而成，富含羊不同生长阶段所必需的蛋白质、维生素、微量元素、矿物质以及抗病促生长剂等。可适当添加氨基酸调节剂，适口性更好，能显著提高羊对精饲料及粗饲料的采食量，日增重明显提高。一般情况下，日增重可比添加其他产品平均提高20%，生长速度更快。

6. 饲喂量和饲喂方法。肉羊的饲喂量要根据其采食量来定，吃多少喂多少。其采食量与羊的品种、年龄、性别、体格和饲料适口性、水分有关。羊采食量越大，其日增重越高。羊日采食干草2~2.5千克，新鲜青草3~4千克，精饲料为体重的2%左右。饲喂时，先喂干草或粗料，然后喂精料，自由饮水。

7. 日常管理。日常要让肉羊适量运动，既要降低能量消耗，促使增重，也要避免因长期不运动导致的消化不良，从而影响育肥。

李渊丽

摘编自《农业科技报》