

是提高羔羊成活率的关键。羔羊第一次吃母乳应在接产人员护理下进行，喂奶前要先对母羊乳房进行清洗和消毒。如果是一胎多羔，要保证每只羔羊都吃到初乳。对于产多羔母羊奶水不足、产后母羊死亡时，要采取人工喂乳或寄养措施。

3. 羊舍保温。由于羔羊出生后体温调节机能不完善，保温能力差，怕冷，因此要使用保温箱、保温灯或电热板给羊只取暖，使用保温箱时底部铺垫麻袋，防止冷风从羊床进入。

4. 羔羊“两段式”渐进过渡饲养。羔羊出生7天内昼夜跟随母羊，自由哺乳，此时期羊床要宽敞，每只母羊羊床2平方米，晚上9点要查看羔羊情况，辅助羔羊进入保温箱。7天后白天跟随母羊，并让羔羊到运动场多晒太阳，晚上进入有保温措施的单独隔栏。

四、常乳期羔羊饲养管理要点

分栏饲养。羔羊出生15天后进入常乳期饲养阶段，昼夜在单独隔栏饲喂，母羊在两侧隔栏，羔羊在中间隔栏。常乳期羔羊饲喂隔栏里放置羔羊补饲槽，少量多次添加羔羊精饲料，训练羔羊采食精料。同时，饲喂新鲜的青草和一些细软的优质干草。常乳期每天上午8点至9点、下午5点半至6点半，把羔羊放入左右两侧母羊饲养隔栏吃母乳，其余时段都在固定隔栏饲喂，自由采食精料和粗饲料。天气晴朗时，让羔羊自由运动、晒太阳。个体小

弱的常乳期羔羊可单独饲喂，适时增加哺乳次数。

五、科学防疫

羔羊出生7天可注射三联四防苗，有口疮发生的15日龄羔羊，可接种羊传染性脓包疫苗（口疮疫苗）。结合种羊出栏月龄合理安排羊痘、传染性胸膜肺炎、口蹄疫、小反刍兽疫疫苗注射时间。在6~8月龄出栏的，可在断奶后接种免疫疫苗。

六、哺乳期母羊饲养管理要点

1. 哺乳前期。母羊哺乳期共2~3个月，饲养管理要点是保证羔羊有充足的奶水及母羊产后体况恢复。在哺乳前期，尤其是羔羊初生后的30天主要靠母乳生长，因此该时期要加强对哺乳母羊的饲养管理，提高泌乳量。母羊产后1小时应给其足够的温水，饲草以易消化的优质鲜草、干草为主，青贮饲料和多汁饲料不宜过早、过多饲喂。母羊产后3天内不宜喂过多的精料，1周后逐渐过渡到正常水平。产后15天，在原有饲喂基础上，每天补饲精料0.4~0.6千克，饲养标准参考妊娠后期。

2. 哺乳后期。母羊的泌乳能力逐渐下降，同时羔羊对母乳的依赖程度降低。该时期可适当降低母羊的营养水平，保持中等膘情即可。适时断奶，羔羊断奶期一般在70~90日龄。

邵庆勇

（云南省畜牧兽医科学院）