

1. 肉鸡腹水综合征。春末夏初易发病，多见于4~5周龄鸡群，发病率一般为3%~5%。病鸡表现出腹部膨大、头面部发紫、呼吸困难，严重者甚至死亡。剖检病死鸡，可见腹部内充满淡黄色液体，心包积液，右心扩张，肺淤血、水肿。该病由多种因素引起，其中，氨气浓度过高、饲喂过多高能量饲料等是主要致病因素。

防治措施：（1）改善饲养环境。注意鸡舍卫生，同时保持通风透气。（2）合理搭配饲料。饲料能量不能过高，食盐不宜过量，钙磷元素要平衡，适当补充维生素。（3）早期限饲。肉鸡在2~3周可适当限饲，投喂90%的正常日粮即可。（4）防中毒。不要投喂对鸡肾脏、肝

脏毒性较大的磺胺类药物，氨基糖苷类、喹诺酮类及其他抗生素用量也不宜过大，禁喂变质或发霉饲料。腹水综合征常继发大肠杆菌病或慢性呼吸道病，要防止继发性感染。

2. 脂肪肝综合征。该病是由鸡体内脂肪代谢障碍引起的一种营养性疾病。病鸡鸡冠和肉髯苍白贫血，排灰白色稀粪便，头颈前伸或背部弯曲，倒地痉挛，随病情加深病鸡消瘦甚至死亡。

防治措施：（1）控制日粮能量水平。提高日粮蛋白质含量1%~2%。每100千克饲料中添加氯化胆碱100克、蛋氨酸50克、多维素5克、维生素B12 12毫克、硒0.05~0.1毫克。（2）病鸡单独喂养。每只病鸡喂氯化胆碱0.1~0.2克和维生素E 1毫克，同时取柴胡30克，黄芩、丹参、泽泻各20克，五味子10克，研细后按每只1~2克的剂量拌料投喂。

刘 灿

摘编自《农业科技报》

## 春末夏初养鸡 谨防两种综合征



邹 鹏/图

管理。各生产单元的人员应相对独立，不能随意跨区活动，避免交叉。人员进入养殖场和生产区应走专用通道，严格对衣服、鞋帽进行消毒。进场物品尽量选择浸泡消毒，或喷淋、熏蒸、擦拭等方式消毒。严格禁止外来车辆、

外来猪肉及其制品进场。本场车辆在每次或每天使用后，要进行清洗消毒。定期进行系统的生产培训和生物安全培训和考核，及时纠正不规范操作。

来源：云南省农业农村厅网站