

猪中暑症状及治疗方法

一、症状

夏季天气炎热，若养殖管理不善，猪只易出现中暑症状，由于发病急，严重时病猪可在2~3个小时内死亡。病猪发病初期呼吸急促、心跳加快、体温升高、四肢乏力、走路摇摆、眼结膜充血、精神沉郁、食欲欠佳，常出现呕吐。严重时，体温升至42℃以上，常出现昏迷、卧地不起、四肢乱划，甚至因心肺功能衰竭而死。

二、治疗方法

1. 凉水疗法。如中暑病猪体温过高则应以物理降温为主，先将病猪移至阴凉处，用冷湿毛巾敷在病猪头部或左胸心区，或者反复用凉水对其头部及全身缓缓喷洒，头部可多喷洒，有意识地让水流入病猪口中。有条件的养殖场可用凉水给病猪灌肠，直到病猪体温下降到38.5℃~39℃为止。

2. 放血疗法。猪发生急性中暑后，应迅速将中暑猪转到通风阴凉处，可剪去中暑病猪的耳尖或尾尖放血100~200毫升，同时，用“十滴水”5~10毫升兑适量清水给每头病猪内服，并对其进行静脉注射复方氯化钠注射液200~500毫升。

3. 刺激疗法。发生中暑后处于昏迷状态的病猪，可用适量的生姜汁、大蒜汁或氨水放置于病猪的鼻前，任其自由吸入，以刺激鼻腔，从而引起猪打喷嚏，促使其苏醒。同时，给中暑猪皮下注射“安钠咖”注射液5~10毫升或“尼可刹米”注射液2~4毫升。

4. 中药疗法。猪发生中暑后，可用鱼腥草、野菊花、淡竹叶各100克、橘子皮25克，煎水给中暑病猪内服；或用六月霜、车前草各100克、藿香25克，煎水给中暑病猪内服；或用鲜马莲根50~100克，洗净后煎水，去渣，一次性给病猪内服；或用绿豆粉100克、醋50毫升、猪胆1个，用水调匀后一次性给病猪内服。

5. 西药疗法。中暑严重的病猪，可对其进行皮下或肌肉注射苯甲酸钠咖啡因0.5~2克，并配“十滴水”或薄荷水或樟脑水10~20毫升让病猪内服。处于过度兴奋状态的病猪，可按病猪每千克体重肌肉注射盐酸氯丙嗪1~3毫克；严重失水的病猪，可对其进行静脉注射生理盐水或5%葡萄糖生理盐水200~500毫升。

摘编自《陕西农村报》