

夏季养牛四注意

1. 调整饲喂时间。夏季气候炎热，牛易口渴，因此，要供给牛群充足饮水，避免中暑。此外，还应调整饲喂时间，选择在清凉时段给牛群喂料，可提高牛的采食量。例如，可将早上饲喂时间调成6点左右，中午时段只饲喂青草，晚上的饲喂时间调整在7点左右。

2. 防暑降温。在牛舍上方铺一层遮阳的干草。如有必要，还可加装风扇或空调进行降温。在中午极为炎热时，还可在牛舍内喷水，增加湿度。但要注意湿度不能过大，否则牛易发生腐蹄病。

3. 防蚊灭蝇。夏季蚊蝇肆虐，养牛户要注意防范。蚊蝇不仅会影响牛的采

食和休息，还会在牛群中传播疾病。建议在牛舍门窗上安装纱窗，防止蚊蝇进入。牛舍里的粪污要及时清理掉，不要留下水坑，做好牛舍内外环境的清洁，可减少蚊蝇滋生。如经过上述处理之后，牛舍内的蚊蝇还很多，可使用养殖场专用的大蚊香进行驱蚊，但要注意开放式牛舍才能使用，封闭式牛舍慎用。

4. 增喂青草。夏季各类杂草、牧草生长旺盛，给牛提供了丰富的草料。养殖户日常应给牛增喂青草，并补充微量矿物元素和维生素。

黄业村

摘编自《安徽科技报》



邹鹏/图

科学贮藏马铃薯方法

1. 堆藏法。选择通风良好、场地干燥的仓库，先用福尔马林和高锰酸钾混合液熏蒸消毒，之后将马铃薯入仓，一般每平方米堆750千克，高约

1.5米，周围用板条箱、箩筐或木板围好，中间放若干竹制通气筒。此法适宜短期马铃薯贮藏和秋马铃薯的贮藏。

2. 通风库贮藏法。将马铃薯装筐堆码于库内，每筐约25千克，堆高以5~6筐为宜。此外，还可散堆在库内，堆高1.3~1.7米，薯堆与库顶之间至少要留0.6~0.8米高的空间。薯堆中每隔2~3米放一个通气筒，还可在薯堆底部设通风道与通气筒连接，并用鼓风机吹入冷风。夏、秋季，夜间打