

1. 要科学放牧。冬季气候寒冷，放牧时应选在地势较低和山峦环抱的向阳平滩地，且不要远距离放牧，以便天气骤变时能让羊群及时返圈。同时，冬季枯草期长，草场不足，应尽量节约牧地。

2. 要适时整群。羊群进入冬场前，最好进行整群。应适当淘汰老弱羊和营养过差的羊，其余按营养状况组群，便于放牧。同时，越冬期间常有母山羊产仔，应在产仔前将母山羊移入产羔室单独护理。初生羔羊经过一段时间吮乳、适时训练后，要单独组织羔羊群近距离放牧，避免其随大群山羊远距离放牧，收牧后要赶入羔羊圈，与

成年羊群分开饲养。

3. 要防寒保暖。检查羊舍，修补破漏，防止穿堂风和雨雪飘入，保证舍内温暖干燥。寒潮来临时，应加厚垫草。此外，为保暖在舍内燃火升温不可取，羊只因烟熏可能会患上肺炎。

4. 要卫生防疫。冬季要经常检查圈舍，保持圈舍、垫料、饮水、草料的清洁卫生，必要时对圈舍进行彻底消毒。同时，养羊户要学会预防和治疗羊的主要疾病，并管理好羊只，使其不与病羊接触，做好防疫工作。在初冬季节，羊身上易长羊虱，一旦发现，可用菜籽油、煤油混合后涂在羊只患处，每天3至5次，连续涂三四天即可。也可取生猪油100克、生姜150克捣烂混合后涂在羊只患处，涂1至2次即可消除。

来源：中国农科新闻网

冬季山羊养殖做好“四要”



土壤磷素活化剂（昂力素）拌种，豆苗2.5~3台叶期施普钙15~18千克/亩。在整个生育期间应及时灌好现蕾开花水、盛花结荚水、灌浆鼓粒水等3至4次。

6. 病虫害防治。根据当地蚕豆病虫害的发生规律，按植保要求采取综合防治措施，合理选用药剂及用量，按照蚕豆绿色高效植保技术操作规程进行防治作业。做好病虫害的预测预报工作，用100~150克/亩的粉锈宁

防治锈病；用吡虫啉防治蚜虫和潜叶蝇；在蚕豆播种后3至4天喷施封闭式除草剂，在杂草一叶一心时用15%的“精稳杀得”60毫升/亩或“威霸”60~70毫升/亩防除田间杂草。

7. 适时收获。收干籽粒的，以多数豆荚变黄，少数变成黑褐色，下部叶片枯死，上部叶片呈黄绿色为最佳收获期；鲜食豆荚以豆粒充分鼓起，豆荚嫩绿，不翻白色为最佳采摘期。