

规模化养猪场冬季管理要点

近年来，各地养猪场仔猪腹泻时有发生，危害养猪业的健康发展。仔猪腹泻多为流行性腹泻，也可能是因传染性胃肠炎、非典型性猪瘟、伪狂犬病等混合感染导致。春季仔猪腹泻预防及管理要点如下：

1. 做好保温工作。建议新生仔猪猪舍室温保持在 $30^{\circ}\text{C} \sim 34^{\circ}\text{C}$ ，保育仔猪猪舍室温保持在 $22^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ 。舍内保温措施可采用红外线保温灯、保温板、远红外加热保温箱等。

2. 加强免疫接种。做好母猪的免疫接种工作，尤其要做好猪瘟、伪狂犬病、蓝耳病、细小病毒等病毒性疾病的免疫接种。日常定期进行免疫抗体检测，抗体不合格的猪只及时进行补充免疫。在母猪产前40天、20天，要分别注射猪胃肠炎和流行性腹泻二联灭活疫苗2毫升。

3. 饲喂优质饲料。选择优质的配合饲料饲喂母猪，严禁饲喂霉变等变质饲料。为防止饲料发生霉变，可

在饲料中添加脱霉剂“霉可脱”“脱霉王”，每吨饲料添加量为 $1 \sim 2$ 千克。

4. 强化仔猪饲养管理。做好仔猪出生后 $1 \sim 7$ 天、 $14 \sim 21$ 天以及断奶后7天的保温和喂初乳工作。仔猪出生后 $2 \sim 3$ 天，要注射葡聚糖铁钴注射液 $1 \sim 2$ 毫升、 0.1% 亚硒酸钠注射液1毫升；仔猪出生7天后开始诱食， $15 \sim 20$ 日龄正式补饲，补充饲料最好选用质量信誉好的商品料；断奶期间要减少应激，断奶5天内的仔猪应限饲，即少添勤喂，避免发生腹泻。同时要在仔猪饲料中适当添加抗生素，可有效防止腹泻。

5. 注重生物安全。及时清理粪污，定期消毒猪舍，保持干燥卫生。空猪舍可选用氢氧化钠消毒，带猪一起消毒可用聚维酮碘或有机氯制剂。病死猪要进行焚烧或深埋等无害化处理，防止疫病传播蔓延。

摘编自《农业科技报》

对虫害，在蚜虫株率达8%时，可用吡虫啉可湿性粉剂兑水喷雾。菜青虫、小菜蛾、菜螟虫等鳞翅目害虫应在幼虫3龄前施药，可选用高效氯氰菊酯、甲氨基阿维菌素等药剂喷雾。针对病害，应提前备足菌核病防控药剂，并在初花期前一周内用无人机喷施咪鲜胺，实行统防统治。对于菌核病发生较重的田块，可在盛花期用无人机喷施氟唑菌酰胺、多菌灵等杀菌剂加强防治。针对鸟害，花蕾易遭鸟类偷食等情况，可采取扎稻草人、挂彩条绳、施用驱鸟剂等多种方式防控鸟害。

来源：农业农村部网站