



春季养羊谨防五种常见病

1. 流感。病羊表现为精神沉郁，食欲减退或不食，呼吸急促（每分钟120次左右），体温达40.5℃。

治疗措施：每天上午用复方氨基比林20毫升、下午用安乃近20毫升进行肌肉注射，连用2天，另加地塞米松10毫升进行肌肉注射。

预防措施：按每100公斤体重用长效青霉素10毫升、卡那霉素250万国际单位分别进行肌肉注射，每天2次。

2. 山羊伪结核病。该病是由伪结核杆菌引起的一种接触性、慢性传染病。病羊表现为逐渐消瘦、衰弱、呼吸加快，时有咳嗽，严重者甚至死亡。

治疗措施：发病早期用0.5%的黄色素10毫升静脉注射，如与青霉素并用可提高疗效。若出现脓肿，按一般外科常规处理，即在脓肿未破皮时，用刀将其切开，将脓液排除，用浓碘酒消毒，创口内塞入浸有碘酒的纱布条，将排出的脓液进行深埋处理，同时地面用百毒杀进行消毒。

预防措施：日常做好羊群卫生工作，皮肤破伤应注意及时处理，发现病羊及时隔离治疗。

3. 传染性脓疮。该病俗称羊口疮，是一种由病毒引起的传染病，以口唇等处皮肤和黏膜形成丘疹、脓疮、溃疡和结成瘤状厚痂为发病症状。该病

在羊群中常可连续多年发病。

治疗措施：可用0.1%~0.2%的高锰酸钾溶液冲洗创面，再涂2%的龙胆紫、碘甘油或5%的土霉素软膏，每天1至2次。

预防措施：定期进行疫苗接种，严防创伤感染。发病后要对全群羊多次彻底检查，对病羊进行隔离治疗。同时，用2%的氢氧化钠溶液或10%的石灰乳等彻底消毒用具和圈舍。

4. 巴氏杆菌病。该病多发生于羔羊，当寒冷、潮湿、多雨雪、气候剧变、圈舍通风不良、营养缺乏和饲料变质时易发生内源性传染。

治疗措施：将青霉素80万国际单位、链霉素100万国际单位混合，一次性肌肉注射，每天2次，连用3天。对重病羊，可用四环素或磺胺噻唑钠等配合5%或10%的葡萄糖注射液静脉注射，待症状缓解后，再改用其他药物继续治疗。

预防措施：日常加强饲养管理，避免羊只受寒冷侵袭，做好环境消毒工作。对已经发病的羔羊，应查明诱因，改善饲养管理条件，并进行隔离治疗。同时，用10%的石灰乳或3%的甲酚皂溶液、5%的漂白粉溶液消毒圈舍和用具。

5. 皮肤真菌病。该病俗称脱毛癣，是由真菌引起的传染性皮肤疾病，多发生在羊的颈、肩、胸、背部和肛部上侧。发病初期患处有豌豆大小结节，后期界限明显并覆有灰白色或