



郝亚鑫/图

春季羔羊常见疾病及其防治

春季昼夜温差大，气温骤变天气较多，一旦羔羊养殖管理不善，会导致常见病的发生。

一 主要常见病

1. 咀疮。羔羊咀疮病是病毒性传染病，是由山羊脓疱性皮炎病毒引起，易在口、唇等处的皮肤形成丘疹、溃疡或疣状结痂，严重影响羔羊的健康。因此，一旦发现羔羊患咀疮病要立即进行隔离，并选用碘甘油和红霉素软膏混合均匀涂抹于患处，每天2~3次，连用3天，疗效较好。同时，对圈舍及用具彻底消毒。

2. 肺炎。该病是春季羔羊发病率较高的疾病之一，发病诱因主要是由于羔羊营养不良、缺乏维生素、断奶过早以及抵抗力降低、春季阴雨潮湿天气等。日常加强对羔羊的饲养管理，喂足母乳，保持羊舍干燥卫生、通风良好，预防羔羊肺炎的发生。治疗患病羔羊，可用支原净（泰妙菌素）和林可霉素混合，进行肌肉注射，每天1~2次，连续用药3天。

3. 白肌病。春季羔羊容易患白肌病，该病是一种伴有骨骼肌和心肌变性并发生运动

障碍和急性心肌坏死的微量元素缺乏症。患病羔羊表现出精神不振、拱背、运动困难、四肢无力等症状。治疗羔羊白肌病，一般使用硒制剂进行肌肉注射和补饲亚硒酸钠。同时加强产前母羊的饲养管理，供给优质豆科牧草，使母羊产羔前补硒充足，可以减少该病的发生概率。

4. 矿物质缺乏症。该病是羔羊常见病症，患病羔羊主要表现为瘦弱、被毛粗糙、食欲减弱、磨牙、口腔干燥、排灰白色稀便、常出现舔食、啃咬和吞咽异物，尤其爱啃墙圈土。为防止羔羊出现以上症状，需要对羔羊补饲适量矿物质添加剂及硒、铁等微量元素。

5. 腹泻。春季羔羊容易腹泻，该病主要是因饲养管理不当造成，如母乳不足、营养不平衡、圈舍寒冷潮湿、环境不卫生和通风不良等。羔羊出现腹泻，应及时进行治疗，喂给羔羊收敛吸附剂（活性炭约30克、鞣酸蛋白2克、水适量），同时进行肌肉注射庆大霉素和痢菌净等，连续用药3天。

二 综合防控措施

1. 加强对母羊产前产后的营养供给。在母羊妊娠后期和哺乳期间，保证供给其充足的饮水和优质干草、精料。如果母羊膘情较好，在产羔的1~3天内可以不喂或少喂精料，多喂或只喂优