

春季是产蛋鸡生育繁殖较快的季节，为使产蛋鸡开产早、产期长、产蛋量高，在饲养管理上需注意以下方面：

1. 适宜温度。鸡舍保持适宜的温度，可保持产蛋率平稳和节省饲料。产蛋鸡最适宜温度为15℃~25℃，温度在20℃时产蛋率较高；温度15℃以下每降低1℃，产蛋率将下降1.5%；温度26℃以上，蛋壳变薄；温度30℃以上破蛋率明显增加。鸡舍相对湿度应保持在60%~70%，日常要注意鸡舍的通风换气，鸡舍内二氧化碳含量不能高于0.3%，氨气浓度不能低于15~20微升/升。

2. 合理光照。产蛋阶段光照时间要增加而不能缩短。密闭式鸡舍光照可在原来8小时/天的基础上，每周增加1小时，连续2周以后每周再增加半小时，直至每天光照达16小时为止，最多不超过17小时，之后保持稳定。开放式鸡舍全靠自然光照，不足16小时的部分可用人工光照补充。一般早、晚各开灯、关灯1次，比较理想的是采用早晨补充光照。人工光照所用光源以白炽灯为宜。一般产蛋鸡的适宜亮度是在鸡头部有5~10勒克斯的光照度即可。

3. 科学饲养。鸡产蛋具有规律性，在饲养时应根据产蛋率的上升和下降进

行相应的日粮调整。在产蛋量上升阶段，从18周起增加日粮中钙的比例，由青年鸡的1%增加到2%，并逐渐改喂产蛋鸡饲料；当产蛋率达5%时，日粮中粗蛋白质为14%、钙含量为3.2%；当产蛋率达50%时，蛋白质增至15%、钙含量为3.4%；产蛋率达70%时，粗蛋白质增至16.5%、钙含量为3.5%；当进入产蛋高峰时段，每只鸡每天摄入的蛋白质，轻型鸡不能少于18克，中型鸡不能少于20克。当鸡群产蛋率下降时，应逐渐降低营养水平，蛋白质水平降到14%，之后保持不变。

摘编自《陕西农村报》

春季蛋鸡饲养管理要点



郝亚鑫 / 图

质干草，但饮水要充足，这样可以防止母羊消化不良。

2. 羔羊饲喂管理。初乳具有特殊的免疫抗体和营养物质，因此羔羊出生后要让其尽早吃上初乳，不饲喂其他饲料，这样能提高羔羊的健康水平，降低患病概率。提早给羔

羊补饲，可以促进前胃的发育，一般羔羊从10日龄开始到断奶前，都要进行补饲。保证充足的饮水，饮水以洁净卫生的温水为宜，如果羔羊过度缺水或饮用不卫生的冷水，容易引发疾病。

来源：中国农科新闻网